

**Výbor společnosti:****Předseda**

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

**1. místopředseda**

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

**2. místopředseda**

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

**Tajemník**

MUDr. Jan Burkert, Ph.D.

**Pokladník**

MUDr. Janka Slatinská

**Členové výboru:**

Doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.

Doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.

MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.

MUDr. Lenka Hošková, Ph.D.

**Revizní komise:**

MUDr. Michal Kudla, Ph.D. – předseda

MUDr. Miroslav Koňářík

MUDr. Jan Šimonek

V Praze, dne 15.2.2021

## **Stanovisko výboru Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP k recentní pandemii COVID-19 ze dne 15.2.2021**

Toto stanovisko navazuje na předchozí stanovisko výboru SOT ČLS JEP ze dne 19.12.2020.

Výbor SOT ČLS JEP doporučuje co nejrychlejší očkování pacientů po transplantaci solidních orgánů a v čekacích listinách k transplantacím, kterým to umožňuje jejich zdravotní stav, dostupnými mRNA vakcínami. Důvodem pro očkování co největšího podílu nemocných po transplantacích je významně vyšší pravděpodobnost vzniku závažných komplikací onemocnění COVID-19 v této skupině nemocných. Důvodem pro doporučení očkování mRNA vakcínami s vyšší mírou účinnosti je známý fakt snížené imunitní odpovědi na očkování při užívané imunosupresi.

Výbor SOT ČLS JEP doporučuje očkovat nemocné nejpozději v intervalu 1-3 měsíce po provedené transplantaci. U nemocných, u kterých již byla aplikována první dávka mRNA vakcíny, a nemocný podstoupil transplantaci orgánů před aplikací druhé dávky, doporučujeme tuto druhou dávku podat nejpozději v intervalu 1-3 měsíce po transplantaci, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. Podání 1. dávky vakcíny bezprostředně před transplantací nedoporučujeme vzhledem k vysoké peritransplantační imunosupresi a předpokládané nedostatečné serokonverzi po vakcinaci.

Výbor SOT ČLS JEP doporučuje aplikaci monoklonální protilátky bamlanivimabu pro nemocné po orgánových transplantacích nebo nemocných v čekacích listinách k transplantaci orgánů s dosud lehkým průběhem onemocnění COVID-19, jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci ani podávání kyslíku, případně hospitalizovaným pacientům v transplantačních centrech z jiných důvodů a s ověřeným asymptomatickým nebo oligosymptomatickým průběhem onemocnění COVID-19. Podávání bamlanivimabu bude možné ambulantním pacientům v nemocnicích s urgentním příjmem I. nebo II. typu.

Lékaři těchto zdravotnických zařízení by měli kontaktovat příslušná transplantační centra a konzultovat případné změny v imunosupresivní terapii, ostatní medikaci a aplikaci bamlanivimabu, případně dalších dostupných monoklonálních protilátek se stejnou indikací a podobným mechanismem účinku.

Za Výbor SOT ČLS JEP

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. v. r.  
1. místopředseda SOT ČLS JEP

Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. v. r.  
předseda SOT ČLS JEP